

Combination میں کیا جاتا ہے۔ اگلے ساتھ بتایا کر دی جاتی ہے۔

MINIOXIDIL میں ایک خاص خصوصیات یہ ہے کہ اس کے استعمال سے اہل کا تھکاوٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو اس مقامات اہل کے لئے کو دینے کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جہاں اہل نہیں آتے وہاں لگائی جاتی ہے۔

NICOR RANDIL : ذرا بتا کیلئے بہت مفید ہے۔ یہ پوٹاشیم جذب کرنے کی قوت بھی بڑھاتی ہے۔ اس کا

خصوصیات کا ذکر دیگر دوا کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس کا اثر خونی (ISCHEMIA) کم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔

ایک نئی دوا مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ جو ایک طرف خونی کی تائید کو بڑھاتی ہے اور دوسری طرف ناک کے سرکولیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اس کو Omopatriil کہا گیا ہے۔ یہ end Organ اور اس کے دل، جگر، گردے اور دماغ کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔

ورلڈ آرگنائزیشن کا پرائمری ہائیپرٹینشن میں دوائیاں دینے کی صلح اگر ہائیپرٹینشن کے ساتھ

مریض کی دوسری بھی شکایات ہوں تو

(1) پارہ ACE INHIBITORS کی بھی طرح کے ہائیپرٹینشن اور سکندری ہائیپرٹینشن کے لئے کو دی جاسکتی ہے۔ اس لئے ذرا کر آخر تک دوا دینے ہیں۔

(۲) ہائیپرٹینشن پرائمری ہو تو پہلے تھائی ڈائیڈ ہائیپ کی دوائی دینی چاہیے

(۳) اس کے بعد (1) BB, ARB, ACE اور (۲) CCB دینی چاہیے۔

(۴) دوسری (1) Aldosterone یا Clonidine یا Reserpine یا Vasodilator

(۵) ان کا پورا کر کو بھی استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔

کچھ خاص احتیاط :-

1 دواؤں کو ریپلیس کر مریض کا پورے دیکھنا چاہیے جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی حالت میں ACE In

2 دواؤں کو ریپلیس کر مریض کا پورے دیکھنا چاہیے جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی حالت میں ACE In

3 دواؤں کو ریپلیس کر مریض کا پورے دیکھنا چاہیے جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی حالت میں ACE In

4 دواؤں کو ریپلیس کر مریض کا پورے دیکھنا چاہیے جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی حالت میں ACE In

بلاکس ایک دواؤں کو bisoprolol Metoprolol, Succinolol کو Convediol دی جاتی ہے

یہ دواؤں کے کارآمد اور پیچیدگی کی قوت کو کم کے بلڈ پریشر کم کرتے ہیں۔ لائیو لائیو دواؤں سے ڈی لولی، ہائیڈرک کے ساتھ ساتھ الفا بیکسٹر کا بھی کارآمد ہے۔

نئے بیٹا بول : نئی دوائی ہے ہائیڈرک B1 کہیہ ساتھ ساتھ B2 بھی بلاک کرتے ہیں جس کی ضرورت خون کی تائید کو کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے نئے بیٹا بول B2 کم بلاک کرتی ہے خاص طور پر 5mg کے ڈوز میں اس لئے استعمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اب زیادہ پائیدار ہائیپرٹینشن Combination میں مارکیٹ میں آئی ہے۔

احتیاط :- مذکورہ دواؤں کی بیماری والوں کو دینی چاہیے۔ جیفرال Peripheral اور Claudicalini کے مریضوں کو دینی چاہیے۔ ذیابیطس کے مریض جو انسولین لے رہے ہوں انھیں بھی دینی چاہیے۔ خون کے بہاؤ کی کمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں موٹی آنا اور غصے پڑنا ہو سکتا ہے۔

(۶) کچھ عیسائی بلاکس (Calcium Channel Blockers)

دوسرے کے ہوتے ہیں۔ 1 ہائیڈرو پائین
دوسری 1 ڈیلاڈیم 2 دیپال

جہاں بیٹا بلاکس کا فائدہ نہیں کرتی وہاں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ خاص کر کے جب خون میں صحیح مقدار میں آکسیجن نہیں بنتی اور سینے میں درد ملتی ہوتی ہے۔ خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوا بیماریاں جیسے Arrhythmia اور اربائی تھامیا کی بیماریوں کے لئے کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ برین ہرنج کے لئے بھی اس میں پہلے سرور دھوتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے۔ کھلائی، بخون میں سوجن آسکتی ہے۔ اور ڈائیگنوسٹک میں بھی مشکلات ہوتی ہے۔ اور پھر بھی آسکتے ایسا ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان دواؤں کو فوراً بند کرنے سے بیماری والوں کو لوٹ آتی ہے۔

احتیاط :- جو کئی قسم کے کچھ بیماریاں کر لیتے ہیں۔ بلاکس ہونا پھر سے کا سرخ ہونا، سوزوں میں ملتی سوجن آتا۔ دوسری قسم میں بھی دھوکا کم ہو سکتی ہے۔ اور دوا پال میں قبض ہو سکتا ہے۔

(۷) نئی دوا کی ایجاد Vasopeptidase واسوپپٹائڈس

:- یہ پائیدار نئی دوا استعمال کی جائے۔ جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جب یہ خون کی تائید کو بہت کم کر دیتی ہے۔ اس کی ایک صرف تین ہی دواؤں کی ایجاد ہوئی ہے۔ Hydrolazine (1) اور Minoxidil (2) Nicorandil (3)

احتیاط :- علامات کو ACE کی طرح ہے ساتھ ساتھ جیروں میں سوجن آسکتی ہے۔ ہارٹ کی دھوکا ہو سکتی ہے اس لیے اس کا استعمال